Medicamentos para el tratamiento de adicciones. Información sobre el trastorno por consumo de alcohol

NOMBRE	¿QUÉ HARÁ ESTO?	¿CÓMO TOMO ESTOS MEDICAMENTOS?	¿POR QUÉ DEBO ELEGIR ESTOS MEDICAMENTOS?	¿QUÉ DEBO SABER?
Acamprosate Nombre comercial: Campral	Me ayudará a no querer consumir alcohol. Permitirá que mejoren algunos de los síntomas relacionados con dejar de consumir alcohol (por ejemplo, problemas para dormir, ansiedad).	Debo tomarlo por vía oral, 3 veces al día.	Tengo una historia familiar de trastorno de consumo de alcohol; tengo una enorme necesidad de consumir alcohol; **muy útil** si tengo síndrome de abstinencia cuando no consumo alcohol.	Este medicamento puede empeorar los problemas en los riñones, si ya los tengo. Puede ser difícil tomar el medicamento periódicamente pues debo tomarlo 3 veces al día.
Disulfiram Nombre comercial: Antabuse	Este medicamento me enfermará si consumo alcohol.	Lo tomo por vía oral una vez al día.	Tengo una historia familiar de consumo de alcohol; no puedo dejar de pensar en consumir alcohol; me he beneficiado del disulfiram antes; tengo una sólida red de apoyo para asegurarme de tomarlo.	Este medicamento puede provocar problemas en el hígado o en el corazón. No es bueno tomarlo si estoy embarazada o tengo problemas médicos crónicos como enfermedades del corazón o diabetes. No es útil si no puedo dejar de consumir alcohol por completo, porque enfermaré si consumo alcohol mientras estoy tomando el medicamento.
Naltrexone Nombre comercial: Vía oral: **ReVia** por inyección: **Vivitrol**	Me ayudará a no querer consumir alcohol. No tendré deseos incontrolables de consumir alcohol. Si tomo un trago, no sentiré sus efectos directamente.	La tomaré por vía oral una vez al día o puedo aplicarme una inyección una vez al mes.	**Muy** útil si tengo historia familiar de trastorno de consumo de alcohol. **De alguna manera** útil si tengo deseos incontrolables de consumir alcohol; ayuda a las personas a reducir el consumo del alcohol además de ayudarlas a dejar de consumir alcohol.	Este medicamento no se recomienda si tengo enfermedad hepática grave o si actualmente estoy usando opioides. Puede ser doloroso aplicarse la inyección. Las inyecciones no se recomiendan si tengo miedo a las agujas. Si necesito tomar opioides para el dolor, no funcionarán tan bien o tan directamente y tendré que trabajar con mi proveedor para buscar otra cosa que funcione.

Fuente: Modificado de SAMHSA/CSAT TIP 49, actualizado 9/2022

Medicamentos para el tratamiento de adicciones. Información sobre el trastorno por consumo de opioides

NOMBRE	¿QUÉ HARÁ ESTO?	¿CÓMO TOMO ESTOS MEDICAMENTOS?	¿POR QUÉ DEBO ELEGIR ESTOS MEDICAMENTOS?	¿QUÉ DEBO SABER?
Buprenorphine **Nombre comercial:** Vía oral: ~Suboxone ~Zubsolv ~Subutex ~Otros nombres Por inyección: ~Sublocade	Me ayudará a no querer consumir opioides. También tendré menos síndrome de abstinencia de opioides. Me protegerá parcialmente de una sobredosis, si uso opioides.	Es una película o una tableta que se coloca debajo de la lengua una o más veces al día. Esta es una inyección que se aplica mensualmente.	Si tengo dificultades con los deseos incontrolables de consumir opioides o con el síndrome de abstinencia de opioides; si estoy embarazada o amamantando, este medicamento es una buena opción; si quiero la conveniencia de recibir mi medicamento recetado en una farmacia para poder llevarlo a casa; puedo recibir el medicamento por inyección, si tengo dificultades para tomar medicamentos todos los días.	Este medicamento puede provocar síndrome de abstinencia de opioides, si sigo usando opioides cuando comienzo a tomarlo.
Methadone	Me ayudará a no querer consumir opioides. No tendré síndrome de abstinencia de opioides. Me protegerá parcialmente de una sobredosis, si uso opioides.	Lo tomo por vía oral una vez al día. Generalmente es en forma de líquido y en algo que tomo.	Si me inyecto opioides; si no puedo dejar de consumir o de pensar en consumir; cuando no lo uso, tengo mal síndrome de abstinencia de opioides; si estoy embarazada o amamantando, esta es una opción segura; intento dejar de consumir pero vuelvo a hacerlo; he intentado con otros medicamentos y no funcionan para mí.	Este medicamento puede provocar sobredosis o hacer que me sienta somnoliento. Puede provocar problemas cardíacos o problemas para respirar, especialmente si estoy consumiendo benzodiazepines o alcohol mientras estoy tomando este medicamento. Debo asistir a un programa de Tratamiento de Opioides (OTP) para recibir el medicamento, no es un medicamento con receta que puedo obtener en una farmacia y llevar a casa (es posible que pueda recibir dosis para llevar a casa de OTP).
Naltrexone **Nombre comercial:** Vivitrol	Me ayudará a no querer consumir opioides. No podré sentir otros opioides cuando esté tomando este medicamento.	Recibiré una inyección una vez al mes.	Si tengo deseos incontrolables de consumir opioides o síndrome de abstinencia de opioides y nunca he probado un medicamento; puedo recibir el medicamento por inyección, si tengo problemas para tomar medicamentos todos los días; Methadone o buprenorphine no funcionan para mí o tengo efectos secundarios.	Este medicamento no se recomienda si tengo enfermedad hepática grave o si actualmente estoy usando opioides. Si recientemente consumí opioides, puede provocar un síndrome de abstinencia de opioides grave cuando comience a tomarlo. Puede ser doloroso aplicarse la inyección. Las inyecciones no se recomiendan si tengo miedo a las agujas. Si necesito tomar opioides para el dolor, no funcionarán tan bien o tan directamente y tendré que trabajar con mi proveedor para buscar otra cosa que funcione. Si dejo de tomar este medicamento, tengo mayor riesgo de tener una sobredosis de opioides.

Fuente: Modificado de SAMHSA/CSAT TIP 49, actualizado 9/2022